



トビイロウンカ警報発令！



(速やかに防除を行いましょう！)

対策のポイント

1. 速やかな防除が必要です！

- ・9月11日に、大分県はトビイロウンカ警報第1号を発令しました。中部振興局管内でも坪枯れが発生しており、今後急速に拡大する懸念があります。速やかに防除を行い被害拡大を防止しましょう。
- ・飼料用米及びWCS用水稻など、熟期の遅い品種は長期間加害されます。複数品種を栽培している場合は優先的に防除しましょう。

飼料用米・WCS用水稻どちらにも使えるウンカ類殺虫剤一覧

農薬名	使用量/10a	収穫前制限日数
スタークル液剤10	1000倍(60~150L)	収穫7日前まで
アルバリン顆粒水溶剤	3000倍(60~150L)	収穫7日前まで
スタークル顆粒水溶剤	3000倍(60~150L)	収穫7日前まで
ダントツ水溶剤	4000倍(60~150L)	収穫7日前まで
トレボン粉剤DL	3~4kg	収穫7日前まで
トレボン乳剤	1000~2000倍(60~150L)	収穫14日前まで
ベストガード水溶剤	2000~4000倍(60~150L)	収穫14日前まで


*参考 散布水量別使用量

希釈倍率	散布水量/10a		
	60L	100L	150L
4000倍	15ml	25ml	38ml
3000倍	20ml	33ml	50ml
2000倍	30ml	50ml	75ml
1000倍	60ml	100ml	150ml

*防除を行う上での注意点

- ①一株当たり、成虫又は幼虫が数頭みつかったらすぐ防除
- ②株元まで確実に薬剤がかかるよう注意

2. 坪枯れした場合は刈分けを！



- ・坪枯れ部分の混入による品質低下を防止しましょう。