

## ツクシアブラガヤ

*Scirpus rosthornii* Diels

カヤツリグサ科  
Cyperaceae

### カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 IB

選定理由

県内分布 (日田低地・丘陵地), (玖珠丘陵地・山地)

分布域 九州(長崎・大分・宮崎・鹿児島)

生育環境 丘陵地の溪流辺や草地。

現 状 上記の生育地は, いずれも生育状態の再確認ができず, 現状不明。

## サンカクイ

*Scirpus triqueter* L.

カヤツリグサ科  
Cyperaceae

### カテゴリー

大分県 II  
環境庁 掲載なし

選定理由 県内の生育地は池沼や河川に限られていて, 個体数も少ない。河川や池沼の改修, 洪水による流失などで, 生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布 耶馬溪・国東丘陵地, 中津・宇佐低地, 別府湾沿岸域, 豊後水道域

分布域 北海道 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) 沖縄 朝鮮半島 中国・中国(東北部) ,ウスリー ,マレーシア ,インド~欧州(南部)

生育環境 低地の水辺や湿地。

現 状 生育環境が変化して衰退した所がある。

## カガシラ

*Scleria caricina*  
(R. Br.) Benth.

カヤツリグサ科  
Cyperaceae

### カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 IB

選定理由

県内分布 (中津・宇佐低地)

分布域 本州(千葉以西 東海道 中国地方等) 四国 九州(佐賀・熊本・大分・宮崎・鹿児島) 沖縄 台湾 ,インド ,オーストラリア

生育環境 低地の池沼。

現 状 暖地植物。採集された標本はあるが, その後, 生育状態は把握されていない。