

チャボゼキショウ

Tofieldia coccinea Richardson
var. *kondoi* (Miyabe et Kudo) Hara

ユリ科
Liliaceae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 (由布・鶴見火山群)

分布域 北海道 本州(北～中部) 九州(大分)

生育環境 火山山頂帯の岩場。

現 状 1980年代後半に「由布・鶴見火山群」で生育地が確認されたが、その後、生育状態は把握されていない。

ホトトギス

Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook.

ユリ科
Liliaceae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 掲載なし

選定理由 県北地域の崖地に広く生育していたが、人による採取で消滅した生育地が多くなり、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 耶馬溪地区，英彦山・犬ヶ岳山地，(祖母・傾山地)

分布域 本州 四国 九州(熊本・大分・宮崎・鹿児島) 沖縄

生育環境 丘陵地や低山地の崖や岩場。

現 状 凝灰岩の崖や岩場に生えるが、人里近い岩場や溪谷などのものはほとんど採取され、消滅してしまった所が多い。「祖母・傾山地」の標本はあるが、その生育地は把握されていない。

タマガワホトトギス

Tricyrtis latifolia Maxim.

ユリ科
Liliaceae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由 県内の生育地は散在し、個体数も少ない。生育環境の変化に左右されやすく、遷移進行による生育状態の悪化が懸念される。

県内分布 (耶馬溪地区)，英彦山・犬ヶ岳山地，九重火山群，由布・鶴見火山群，祖母・傾山地，北川上流域

分布域 北海道 本州 四国 九州(福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎)

生育環境 低山地や山地の湿った岩場，林縁。

現 状 山地の半陰地に生育し、個体は少ない。「耶馬溪地区」の標本はあるが、その生育地は把握されていない。

備 考 国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう，耶馬日田英彦山，祖母傾]