

アオノクマタケラン

Alpinia intermedia Gagnep.

ショウガ科
Zingiberaceae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 掲載なし

選定理由 亜熱帯植物で、本県では「豊後水道域」の島や海岸近くの林内にごく限られて生育する。個体数は極めて少ない。林縁近くのは環境の変化で消滅した所もあり、絶滅の危険性が高い。

県内分布 豊後水道域

分布域 本州(伊豆七島 紀伊)、四国、九州(佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)、沖縄、台湾

生育環境 海岸の林内。

現 状 林内に、生育するものは生育状態がよく、群落をつくって開花や結実しているが、林縁のものは生育状態が悪化している所が多い。

ヒナノシャクジョウ

Burmannia championii Thw.

ヒナノシャクジョウ科
Burmanniaceae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁 掲載なし

選定理由 林内に生える微少な腐生植物。県内の生育地は極めて希で、個体数も僅少。生育地が森林伐採で攪乱され、絶滅の危険性が極めて高い。

県内分布 津江山地、由布・鶴見火山群

分布域 本州(中～西部)、四国、九州(福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎・鹿児島)、沖縄、中国(南部)、マレー、マレーシア、セイロン島

生育環境 丘陵地や低山地の林内。

現 状 ごく最近、良好な生育地が森林伐採で著しく攪乱された。

備 考 国立公園指定植物 [阿蘇くじゅう、瀬戸内海]

シロシャクジョウ

Burmannia cryptopetala
Makino

ヒナノシャクジョウ科
Burmanniaceae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁 掲載なし

選定理由 県内の生育地は極めて希で、生育面積も狭く、個体数も極めて少ない。生育地の林内が人為的に攪乱され、絶滅の危険性が極めて高い。

県内分布 耶馬溪地区

分布域 本州(近畿)、四国、九州(佐賀・大分・宮崎・鹿児島)、沖縄、中国(海南島)

生育環境 丘陵地の林内。

現 状 神社の境内林内に生育するが、その生育面積は極めて狭い。最近、近接する林内にシイタケが栽培され、生育地が攪乱されている。