

ムカデラン

Cleisostoma scolopendrifolium
(Makino) Garay

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 II

選定理由 岩上や樹幹に着生する小形のラン。県内の生育地は極めて希で、生育面積も狭い。周辺地の環境変化や人による採取で、絶滅の危険性が高い。

県内分布 別府湾沿岸域，豊後水道域

分布域 本州(関東地方以西) 四国 九州(佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎)
朝鮮半島(南部)

生育環境 海岸の林縁や林内の岩，樹上。

現 状 小群落をつくって着生している。いずれも生育範囲は狭く，環境の変化で衰退した所や人による採取で消滅した所がみられる。

トケンラン

Cremastra unguiculata
(Finet) Finet

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 IB

選定理由

県内分布 (耶馬溪地区)，(英彦山・犬ヶ岳山地)

分布域 北海道 本州 四国 九州(大分)

生育環境

現 状 「耶馬溪地区」，「英彦山・犬ヶ岳山地」の標本はあるが，その生育地は把握されていない。

ナギラン

Cymbidium lancifolium
Hook.

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 II

選定理由 県内の常緑樹林内に希にみられ，個体数は僅少。人による採取で近年著しく減少し，絶滅の危険性が高い。

県内分布 別府湾沿岸域，豊後水道域

分布域 本州(関東地方南部 東海道 伊豆七島以西) 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) 沖縄
台湾 インド

生育環境 海岸及び丘陵地の林内。

現 状 人による採取で消滅した生育地がある。