

## オニノヤガラ

*Gastrodia elata* Bl.ラン科  
Orchidaceae

## カテゴリー

大分県 II  
環境庁 掲載なし

**選定理由** 県内の生育地は散在する。しばしば群生することがある。森林伐採や土地開発などにより、生育地の減少や消滅が懸念される。

**県内分布** 耶馬溪地区，英彦山・犬ヶ岳山地，玖珠丘陵地・山地，九重火山群，由布・鶴見火山群，大分川・大野川丘陵地，大野川上流域

**分布域** 北海道，本州，四国，九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分)  
台湾，中国，アムール，ウスリー，千島

**生育環境** 丘陵地や低山地の草地や林縁。ナラタケ菌と共生する。

**現状** 生育地が次々と移り変わる。生育環境の悪化に伴い、生育地、個体数とも減少する傾向にある。

**備考** 国立・国定公園指定植物 [ 阿蘇くじゅう，瀬戸内海，耶馬日田英彦山 ]

## ハルザキヤツシロラン

*Gastrodia nipponica*  
(Honda) Tuyamaラン科  
Orchidaceae

## カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 II

**選定理由**

**県内分布** (別府湾沿岸域)

**分布域** 本州(紀伊半島)，四国，九州(大分・宮崎・鹿児島)，沖縄

**生育環境**

**現状** 「別府湾沿岸域」に文献記録はあるが、その生育地は把握されていない。

**備考** 国定公園指定植物 [ 日豊海岸 ]。文献 [ 津山 尚 : Plantae Boninenses Novae vel Criticae 植物学雑誌 53(1939) ]

## ベニシュスラン

*Goodyera biflora* (Lindl.) Hook. fil.  
var. *macrantha* (Maxim.) Hashimoto.ラン科  
Orchidaceae

## カテゴリー

大分県 IB  
環境庁 掲載なし

**選定理由** 県内では、谷沿いの林内に生えるが、いずれの生育地も個体数は少ない。森林伐採や風水害による生育環境の悪化や人による採取もあって、消滅する危険性が高い。

**県内分布** 耶馬溪地区，津江山地，大野川上流域

**分布域** 本州(中部地方以西)，四国，九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)  
朝鮮半島(莞島)

**生育環境** 丘陵地や低山地の谷沿いの林内。

**現状** 谷沿いの生育地で、森林伐採により消滅した所がある。

**備考** 国立公園指定植物 [ 阿蘇くじゅう ]