

アケボノシュスラン

Goodyera foliosa (Lindl.) Benth.
var. *laevis* Finet

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 掲載なし

選定理由 | 県内の生育地は点在し、個体数は少ない。渓谷の開発、森林伐採などで、生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布 | 耶馬溪地区、英彦山・犬ヶ岳山地、津江山地、由布・鶴見火山群、別府湾沿岸域、大野川上流域、祖母・傾山地

分布域 | 北海道 本州 四国 九州(福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
南千島 朝鮮半島

生育環境 | 丘陵地や低山地の林内、渓谷の周辺。

現 状 | 渓谷の森林伐採で消滅した生育地がある。

備 考 | 国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう、耶馬日田英彦山]

ツリシュスラン

Goodyera pendula Maxim.

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁 掲載なし

選定理由 | 県内の生育地は極めて希で、個体数も僅少。森林伐採や人による採取で、絶滅の危険性が極めて高い。

県内分布 | 英彦山・犬ヶ岳山地、九重火山群

分布域 | 北海道 本州 四国 九州(福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島)

生育環境 | 丘陵地や低山地の谷沿いの林内。

現 状 | 「英彦山・犬ヶ岳山地」では、生育地とされる渓谷林が林道開発などで伐採されている。

備 考 | 国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう、耶馬日田英彦山]

シュスラン

Goodyera velutina Maxim.

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

選定理由 | 県内の生育地は点在し、個体数は少ない。森林伐採や風水害による環境変化で、生育地の減少が懸念される。

県内分布 | 耶馬溪地区、英彦山・犬ヶ岳山地、津江山地、由布・鶴見火山群、豊後水道後背地域

分布域 | 本州(中部地方以西) 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
朝鮮半島

生育環境 | 丘陵地から山地の林内。

現 状 | 「由布・鶴見火山群」では、森林の伐採で消滅した生育地がある。

備 考 | 国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう、瀬戸内海、耶馬日田英彦山]