

## ルイヨウボタン

*Caulophyllum robustum* Maxim.メギ科  
Berberidaceae

## カテゴリー

大分県 II  
環境庁 掲載なし

選定理由 県内の生育地は散在するが、個体数は少ない。植林や森林伐採により、生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布 英彦山・犬ヶ岳山地、玖珠丘陵地・山地、九重火山群、由布・鶴見火山群、祖母・傾山地

分布域 北海道 本州 四国 九州(福岡・熊本・大分・宮崎)  
中国・中国( 東北部 ) 朝鮮半島 樺太 ,ウスリー ,アムール

生育環境 低山地の谷沿いの林内。

現 状 森林伐採のため生育環境が変化して、生育状態の衰退した所がみられる。

## イカリソウ

*Epimedium grandiflorum* Morr.メギ科  
Berberidaceae

## カテゴリー

大分県 IB  
環境庁 掲載なし

選定理由 九州では分布域が狭く、県内の生育地は局限されて個体数も少ない。生育地は土地開発や草地開発で改変され、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 九重火山群

分布域 北海道 本州 九州(熊本・大分)

生育環境 低山地の草原や林縁。

現 状 道路工事や土地開発で、消滅した生育地がある。

備 考 国立公園指定植物[瀬戸内海]。熊本県では、ヒゴイカリソウ(*var. higoensis*)とされている。

## コウシュウヤク

*Cocculus laurifolius* DC.ツツラフジ科  
Menispermaceae

## カテゴリー

大分県 IB  
環境庁 掲載なし

選定理由 県内では「豊後水道域」のいずれも離島で生育しているが、生育地、個体数はともに少ない。離島振興などによる開発で森林伐採される所が生じ、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 豊後水道域

分布域 九州(長崎・大分・宮崎・鹿児島) 沖縄  
台湾 中国 東南アジア

生育環境 離島の海岸の林縁や林内。

現 状 森林伐採による環境変化で、生育状態の悪くなった所がみられる。

備 考 暖地植物。