

## イヌノフグリ

*Veronica didyma* Tenore  
var. *lilacina* (Hara) Yamazaki

ゴマノハグサ科  
Scrophulariaceae

## カテゴリー

大分県 IB  
環境庁 II

選定理由	近年，本県での生育地は激減し，個体数も極めて少なくなった。農耕や埋立てなどの人為が加わり，帰化植物との競合もあって生育が阻まれ，絶滅の危険性が高くなっている。
県内分布	耶馬溪・国東丘陵地，中津・宇佐低地，日田低地・丘陵地，別府湾沿岸域，大分川・大野川丘陵地，豊後水道域，豊後水道後背地域，大野川上流域，北川上流域
分布域	北海道 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) 沖縄 中国 朝鮮半島 台湾
生育環境	低地や丘陵地の路傍，草地。
現 状	最近，フラサバソウ ( <i>Veronica hederifolia</i> ) の侵入が著しく，生育状態の衰退した生育地が増えている。

## ヒロバトラノオ

*Veronica kiusiana* Furumi

ゴマノハグサ科  
Scrophulariaceae

## カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 掲載なし

選定理由	
県内分布	(九重火山群)
分布域	九州(熊本・大分) 朝鮮半島
生育環境	
現 状	「久住町古街道」の標本を基に記載されたが，その生育地は把握されていない。
備 考	基準標本産地 [久住町古街道] 国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう，祖母傾] 文献 [古海正福：植物学雑誌 30 (1916)]

## ホソバヒメトラノオ

*Veronica linariaefolia* Pall.

ゴマノハグサ科  
Scrophulariaceae

## カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 掲載なし

選定理由	
県内分布	(玖珠丘陵地・山地)，(九重火山群)，(由布・鶴見火山群)，(大分川・大野川丘陵地)
分布域	本州(紀伊半島以西) 四国 九州(長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) 朝鮮半島 中国・中国(東北部) 蒙古 アムール ウスリー 台湾 シベリア 極東地方
生育環境	丘陵地の草原。
現 状	上記の地域で採集された標本はあるが，植林地や畑地などに変わり，いずれもその生育状態は把握されていない。
備 考	国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう，日豊海岸] オオホソバトラノオ (var. <i>dilatata</i> ) を含む。