

## ミサオノキ

*Randia cochinchinensis* (Lour.) Merrill

アカネ科  
Rubiaceae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

選定理由 国内では分布が限られており、本県では東部・南部地域の常緑樹林内に希に生育している。森林伐採や植林により、生育地の消滅が懸念される。

県内分布 豊後水道域，豊後水道後背地域，北川上流域

分布域 本州(和歌山県) 四国 九州(長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)  
台湾 中国 マレーシア インド オーストラリア

生育環境 低地の林内。

現 状 生育地はスギ植林に改変されて消滅した所が多く，神社林などにわずかに残されている。

## ヘツカニガキ

*Sinoadina racemosa*  
(Sieb. et Zucc.) Ridsd.

アカネ科  
Rubiaceae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

選定理由 県内では沿海地の林内や林縁に生育し，時には大木になる。個体数は多くない。植林や森林伐採などによる影響が懸念される。

県内分布 別府湾沿岸域，豊後水道域，豊後水道後背地域，

分布域 四国 九州(長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) 沖縄  
台湾 中国

生育環境 低地や丘陵地の林内，林縁。

現 状 海岸からその背後地に広くみられるが，いずれも個体数は少ない。

## ツクバネウツギ

*Abelia spathulata* Sieb. et Zucc.

スイカズラ科  
Caprifoliaceae

### カテゴリー

大分県 II  
環境庁 掲載なし

選定理由 県内の分布域は点在し，個体数も極めて少ない。低木のため，植生遷移の進行による生育環境の悪化で，生育地の消滅が懸念される。

県内分布 祖母・傾山地，北川上流域

分布域 本州 四国 九州(佐賀・大分・宮崎・鹿児島)

生育環境 低山地の林内や林縁。

現 状 局所的に分布し，個体数も僅少である。