

ツクシタスキゴケ

Chrysocladium flammeum (Mitt.) Fleisch.
ssp. tukusiense (Nog.) Nog.

ハイヒモゴケ科
Meteoriaceae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 (由布・鶴見火山群)

分布域 九州(大分)

生育環境

現 状 由布岳の1,500m付近での生育記録があるが、近年、その生育状態は確認されていない。

備 考 基準標本産地 [由布山]

ヒロハシノブイトゴケ

Floribundaria aurea (Mitt.) Broth.
ssp. nipponica (Nog.) Nog.

ハイヒモゴケ科
Meteoriaceae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁 I

選定理由

神奈川県箱根以西から九州に分布する。本県では生育地がごく希である。渓谷の森林の伐採や自然災害などにより絶滅の危険性が極めて高い。

県内分布 耶馬溪地区

分布域 本州(箱根以西),四国,九州
台湾

生育環境 丘陵地の渓谷沿いの樹枝や岩。

現 状 耶馬溪地区の数か所に生育していたが過去の集中豪雨により着生木が流失した。現在、着生木が少なく、損失のおそれがある。

ハイヒモゴケ

Meteorium subpolytrichum
(Besch.) Broth.

ハイヒモゴケ科
Meteoriaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

選定理由

関東地方以西から沖縄に分布する。本県では生育地が少ない。森林の伐採や乾燥、自然災害により生育地の減少が懸念される。

県内分布 耶馬溪地区, 大分川・大野川丘陵地

分布域 本州(関東地方以南),四国,九州,沖縄
朝鮮半島,中国,台湾,フィリピン,ヒマラヤ

生育環境 丘陵地や低山地の樹枝や岩上。

現 状 明るく開けた谷部の立ち木の枝や岩上から垂れ下がり、散生している。生育環境が不安定である。