

オオチャイロハナムグリ

Osmoderma opicum Lewis

コウチュウ目
COLEOPTERA
コガネムシ科
Scarabaeidae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 準

選定理由 幼虫は樹洞内の腐食土中で生育するため、大木の伐採により生息範囲がかなり狭められ、生育環境の変化が懸念される。

県内分布 別府市, 湯布院町, 九重町, 庄内町, 竹田市

分布域 本州 四国 九州 屋久島

生息環境 山地の樹洞や立ち枯れの木の中。

現 状 保存の良い森林の減少に伴い、生息域が狭められている。

アカマダラコガネ

Poecilophilides rusticola
(Burmeister)

コウチュウ目
COLEOPTERA
コガネムシ科
Scarabaeidae

カテゴリー

大分県
環境庁 掲載なし

選定理由 堆肥中で生育するため、堆肥の生産が著しく減少した今日では、生息地の消滅や減少が懸念される。

県内分布 中津市, 宇佐市, 山香町, 別府市, 大野町, 三重町

分布域 本州 四国 九州
济州島 朝鮮半島 シベリア東部 中国 モンゴル

生息環境 低山地の雑木林。

現 状 以前はどこにでも生息していたが、近年ほとんどみられなくなっている。

コカブトムシ

Eophileurus chinensis chinensis
Faldermann

コウチュウ目
COLEOPTERA
コガネムシ科
Scarabaeidae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由 森林伐採や植林のため、生息に適した朽ち木などが減少し、生息環境の悪化が懸念される。

県内分布 宇佐市, 豊後高田市, 山香町, 玖珠町, 大分市, 挾間町, 大野町

分布域 北海道 本州 四国 九州 対馬 屋久島 琉球列島
朝鮮半島 中国 台湾

生息環境 朽ち木や腐食土の中。

現 状 生息環境の悪化により、生息地での個体数は減少している。