

ベニイラガ

Demonarosa rufotessellata issiki
(kawazoe et Ogata)

チョウ目
LEPIDOPTERA
イラガ科
Limacodidae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 (佐伯市)

分布域 四国 九州(熊本・大分・鹿児島) 屋久島,トカラ列島(中之島) 沖縄本島,西表島

生息環境 海岸部の暖帯林。

現 状 1950年代に佐伯市で記録がある。近辺の海岸林には生息している可能性があるが、1980年以降の調査では再発見できなかった。

備 考 別亜種が台湾に分布。

ギンイチモンジセセリ

Leptalina unicolor
(Bremer et Grey)

チョウ目
LEPIDOPTERA
セセリチョウ科
Hesperiidae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 準

選定理由 生息地が開発や河川改修工事などによって狭められ、個体数が減少し、生息環境の悪化が懸念される。

県内分布 前津江村,日田市,天瀬町,本耶馬溪町,玖珠町,九重町,別府市,湯布院町,庄内町,大分市,久住町,直入町,竹田市,朝地町,大野町,清川村

分布域 北海道 本州 四国 九州(福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島) シベリア ,アムール ,ウスリー 朝鮮半島 ,中国北部

生息環境 火山草原や低山地丘陵部の草原,河川周辺の草地など,いずれも明るい乾燥草原。イネ科植物が食草。

現 状 火山性草原では生息地の草原が狭められ,河川部では草地が減少し,各地とも個体数が減少している。

スジグロチャバネセセリ

Thymelicus leoninus leoninus
(Butler)

チョウ目
LEPIDOPTERA
セセリチョウ科
Hesperiidae

カテゴリー

大分県
環境庁 準

選定理由 分布が限られ、個体数も少ない種である。県内では九重山群で、生息地が開発によって狭められ、生息環境の悪化が懸念される。

県内分布 前津江村,九重町,庄内町,久住町,竹田市,緒方町

分布域 北海道 本州 九州(熊本・大分・宮崎) アムール 朝鮮半島 ,中国

生息環境 山地の樹林と草地の境に生息し,林縁部のイネ科植物が食草。

現 状 津江山系,九重山群,祖母・傾山系のごく一部に生息地が点在する。