

クロシジミ

Niphanda fusca (Bremer et Grey)

チョウ目
LEPIDOPTERA
シジミチョウ科
Lycaenidae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 I

- 選定理由** 主な生息地である草原疎林や荒地草原が、近年の観光開発、宅地開発などによって大きく姿を変え、生息地の減少や消滅により、絶滅の危険性が高い。
- 県内分布** 前津江村、日田市、天瀬町、本耶馬溪町、耶馬溪町、山香町、九重町、別府市、湯布院町、庄内町、大分市、久住町、竹田市、宇目町
- 分布域** 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) 対馬 アムール ウスリー 朝鮮半島 中国
- 生息環境** 草原疎林や荒地、堤防草地など。幼虫は2令以降、クロオオアリに運ばれてアリの巣中で成育する。
- 現 状** 多産地であった由布・鶴見一帯の高原や九重山群は、開発によって非常に少なくなった。そのほかの産地でも、極めて希。

ルーミスシジミ

Panchala loomisi H.Pryer

チョウ目
LEPIDOPTERA
シジミチョウ科
Lycaenidae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁

- 選定理由**
- 県内分布** (三光村)
- 分布域** 本州 四国 九州(福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島) 隠岐 屋久島
- 生息環境** 食草のイチイガシ、ウラジロガシを主体とする暖帯照葉樹林。
- 現 状** 1950年に三光村で発見されたが、その後の記録はない。
- 備 考** ほぼ県内全域の暖帯照葉樹林を20年間にわたって組織的に調査したが、発見できていない。

ヒメシジミ 本州・九州亜種

Plebejus argus micrargus
(Butler)

チョウ目
LEPIDOPTERA
シジミチョウ科
Lycaenidae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 準

- 選定理由**
- 県内分布** (九重町)、(久住町)、(庄内町)
- 分布域** 本州 九州(大分)
- 生息環境** 九州では火山性一次草原の、マアザミ群落のある湿地。
- 現 状** 局所的な多産地であった飯田高原吉部地区は、農用地開発公団による大規模農地化のため、1984年を最後に、その後の発生がみられない。