

## オオルリシジミ

*Shijimiaeoides divinus barine*  
(Leech)

チョウ目  
LEPIDOPTERA  
シジミチョウ科  
Lycaenidae

### カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 |

選定理由

県内分布 (玖珠町), (九重町), (久住町)

分布域 本州(東北地方, 中部地帯), 九州(熊本・大分)

生息環境 明るい草原, とくに火山草原。幼虫はクララを食草とする。

現 状 県内では, 1970代前半の, 記録が最後である。

## カラスシジミ

*Strymonidia w-album fentoni*  
(Butler)

チョウ目  
LEPIDOPTERA  
シジミチョウ科  
Lycaenidae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

選定理由

県内に広く分布しているが, 生息地である河川上・中流域の河畔林が, 堤防工事などの河川改修工事によって消失し, 生息域が狭められ, 生息地の減少が懸念される。

県内分布

中津江村, 日田市, 耶馬溪町, 三光村, 安心院町, 玖珠町, 別府市, 庄内町, 挾間町, 野津原町, 大分市, 直入町, 竹田市, 朝地町, 緒方町, 三重町, 野津町, 臼杵市, 宇目町

分布域

北海道, 本州, 四国, 九州(福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島)  
国後, カラフト, 朝鮮半島

生息環境

河川沿いのハルニレ。オヒョウがあれば山地の森林にも生息。

現 状

県内の分布は, いずれも河川上・中流部に点在する生息地であり, 個体数は少なくなっている。

## クロツバメシジミ

*Tongeia fischeri* (Eversmann)

チョウ目  
LEPIDOPTERA  
シジミチョウ科  
Lycaenidae

### カテゴリー

大分県 IA  
環境庁 準

選定理由

道路法面のコンクリート吹き付け工事や河川改修工事などによる生息地の環境変化や食草の人による採取などによって, 個体数が激減し, 絶滅に瀕している。

県内分布

山国町, 本耶馬溪町, 耶馬溪町, 中津市, 院内町, 安心院町, 山香町, 玖珠町

分布域

本州, 四国, 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・鹿児島), 香岐, 対馬, シベリア, カラフト, 朝鮮半島, 中国

生息環境

低山地の比較的明るい岩場や河原などの露岩がある場所。ツメレンゲほかのベンケイソウ科植物を食草とする。

現 状

生息環境が限られるため, 分布は点在し, 局限される。

備 考

北部九州には, 沿岸部岩場のタイトゴメやイワレンゲなどを食草とする分布が知られるが, 大分県には例がない。