

## イワイタチシダ

*Dryopteris saxifraga* H.Itoオシダ科  
Dryopteridaceae

## カテゴリー

大分県 II  
環境庁 掲載なし

**選定理由** 本州中部地方以北に主な分布域をもち、九州での分布は希である。本県での分布も低山地に限られており、生育地は少ない。風水害や林内の乾燥化などによる生育環境の悪化が懸念される。

**県内分布** 九重火山群，由布・鶴見火山群

**分布域** 北海道,本州,四国,九州(福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)  
朝鮮半島,中国東北部

**生育環境** 低山地の林内の崖地や傾斜地の岩上に着生。

**現 状** 生育地は比較的標高の高い自然林内に限られ、どの生育地でも個体数が減少している。

## ミヤマワラビ

*Thelypteris phegopteris*  
(L.) Slosson ex Rydb.ヒメシダ科  
Thelypteridaceae

## カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 掲載なし

**選定理由**

**県内分布** (祖母・傾山地)

**分布域** 北海道,本州,四国,九州(大分・鹿児島)  
北半球の温帯域

**生育環境**

**現 状** 1978年に祖母山で採集された標本はあるが、それ以降の生育状態は確認されていない。

## ヨコグラヒメワラビ

*Thelypteris hattorii* (H.Ito) Tagawaヒメシダ科  
Thelypteridaceae

## カテゴリー

大分県 II  
環境庁 掲載なし

**選定理由** 本州中部地方以西に希に分布する。本県での分布は低山地に限られている。尾根の登山道沿いに生えていることが多く、踏み付けや森林伐採などによる生育環境の悪化が懸念される。

**県内分布** 英彦山・犬ヶ岳山地，津江山地，北川上流域

**分布域** 本州(中部地方以西),四国,九州(福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎・鹿児島)  
中国南部・南西部

**生育環境** 低山地の林内や林縁。

**現 状** 登山者による踏み付け被害などで、個体数が減少している生育地がある。