

サガミトリゲモ*Najas indica* (Willd.) Cham.イバラモ科
Najadaceae**カテゴリー**大分県 情報不足
環境庁 IB

選定理由

県内分布 (別府湾沿岸域)

分布域 本州 四国 九州(大分・宮崎・鹿児島)
台湾 ,インド ,マレーシア ,フィリピン

生育環境 低地の池沼。

現 状 生育地の環境が変わり、その生育状態は把握されていない。

イトトリゲモ*Najas japonica* Nakaiイバラモ科
Najadaceae**カテゴリー**大分県 IB
環境庁 IB

選定理由 県内の生育地は点在して少ない。近年、水質汚染や水辺の開発などで生育環境が悪化し、生育地が減少したり消滅したりして、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 姫島・国東海岸、由布・鶴見火山群、別府湾沿岸域、豊後水道後背地域

分布域 本州 四国 九州(大分)
中国(東北部)

生育環境 低地や丘陵地の水溝や池沼。

現 状 水位の変化が著しい池沼では、その生育状態が不安定で、生育の把握できていない所がある。

備 考 本県は、分布の南限域にあたる。

イバラモ*Najas marina* L.イバラモ科
Najadaceae**カテゴリー**大分県 II
環境庁 掲載なし

選定理由 県内で生育するため池は少ないが、良好な生育地では群生していた。近年、水質汚濁がひどく、衰退した生育地が多くなり、生育環境の悪化が懸念される。

県内分布 耶馬溪地区、中津・宇佐低地

分布域 北海道 本州 四国 九州(佐賀・熊本・大分・鹿児島) 沖縄
全世界

生育環境 低地の池沼。

現 状 10年ほど前まで旺盛に生育していたため池でも、水環境が悪くなり、その生育状態が把握しにくくなってきた。