

馬刺しによる食中毒に注意

1 馬刺しによる食中毒の原因

馬肉に感染した住肉孢子虫の1種であるザルコシスティスフェエリーが原因であることを厚生労働省が公表(23.6.17)

2 ザルコシスティスフェエリーの病原性(症状)

- ①食後4～8時間程度で、下痢、嘔吐等の胃腸炎症状を起こすが、速やかに回復する。
- ②発症した人から他の人への感染はない。

3 ザルコシスティスフェエリーによる食中毒の予防法

国が行った実験では、下記のとおり馬肉を冷凍処理することで、住肉孢子虫による食中毒を予防できることが分かった。

●馬肉の冷凍処理

- ・ マイナス20℃ (中心温度) で48時間以上の保持
- ・ マイナス30℃ (中心温度) で36時間以上の保持
- ・ マイナス40℃ (中心温度) で18時間以上の保持

4 馬刺しを販売又は提供する場合の注意点

- ①食肉の卸売店等から馬肉を購入する場合は、冷凍処理しているか確認すること。
- ②冷凍処理しているか確認できない場合は、必ず「3の冷凍処理」をした後に販売又は提供すること。

●馬刺しを原因とする食中毒発生！

H23.9.5、熊本県内の食肉専門店でチルドの馬刺しを買って食べた2家族7人中4人が、下痢・腹痛・嘔吐・発熱等の食中毒症状を呈した。調査の結果、熊本県は食肉販売店を2日間の営業停止とした。

不明な点については、下記の保健所にご相談ください。

保健所名	所在地	電話番号
東部保健所	別府市鶴見字下田井14-1	0977-67-2511
東部保健所国東保健部	国東市国東町安国寺786-1	0978-72-1127
中部保健所	臼杵市大字臼杵字州崎72-34	0972-62-9171
中部保健所由布保健部	由布市庄内町柿原337-2	097-582-0660
南部保健所	佐伯市向島1-4-1	0972-22-0562
豊肥保健所	豊後大野市三重町市場934-2	0974-22-0162
西部保健所	日田市田島2-2-5	0973-23-3133
北部保健所	中津市中央町1-10-42	0979-22-2210
北部保健所豊後高田保健部	豊後高田市是永町39	0978-22-3165

大分県