

シオカゼテンツキ

Fimbristylis cymosa (L.) R. Br.
var. *spathacea* (Roth) T. Koyama

カヤツリグサ科
Cyperaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

選定理由 | 本県では「豊後水道域」に希に生育し、個体数も少ない。波の侵食や釣り人による踏圧などで、生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布 | 豊後水道域

分布域 | 本州(関東地方以西) 四国 九州(長崎・大分・宮崎・鹿児島) 沖縄
台湾 中国 インド マレーシア オーストラリア

生育環境 | 海岸の岩の間隙。

現 状 | 生育する範囲は狭く、波の侵食や人の踏圧により衰退した所がある。

備 考 | 暖地植物。

ツクシテンツキ

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
subsp. *podcarpa* (Nees et Meyen) T. Koyama

カヤツリグサ科
Cyperaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 II

選定理由 | 県内の分布域は狭く、温泉噴気孔付近だけに生育する。土地開発や噴気孔の埋設などにより、生育地の減少が懸念される。

県内分布 | 九重火山群，由布・鶴見火山群，別府湾沿岸域

分布域 | 九州(熊本・大分・鹿児島)

生育環境 | 温泉噴気孔付近の草地。

現 状 | 温泉噴気の影響で他の植物の侵入は少ないが、土地造成や噴気孔の埋設により消滅した所が多くなっている。

備 考 | 九州の特産種。本県は、分布の北限域にあたる。国立公園指定植物 [阿蘇くじゅう]

ノハラテンツキ

Fimbristylis pierotii Miq.

カヤツリグサ科
Cyperaceae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 II (大分)

選定理由 |

県内分布 | (耶馬溪地区)，(日田低地・丘陵地)，(玖珠丘陵地・山地)，(九重火山群)，
(豊後水道域)

分布域 | 本州(近畿・中国地方) 四国 九州(佐賀・長崎・大分)
朝鮮半島 中国 インド フィリピン

生育環境 |

現 状 | 1920年代から30年代にかけての上記地域の標本はあるが、その生育地は、いずれも把握されていない。