

## キスゲ

*Hemerocallis citrina* Baroni  
var. *vespertina* (Hara) M. Hotta

ユリ科  
Liliaceae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

選定理由 | 県内では草原や湿地のかなり広い範囲に生育して、個体数もかなりみられる。生育地が人工牧野や植林地などに改変されて縮小し、生育地の衰退や減少が懸念される。

県内分布 | 玖珠丘陵地・山地，九重火山群，由布・鶴見火山群

分布域 | 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)

生育環境 | 丘陵地から山地の日当たりのよい草原。

現 状 | 「由布・鶴見火山群」，「九重火山群」の草原では，すでに数か所が人工牧野となって消滅している。

備 考 | 国立公園指定植物 [ 阿蘇くじゅう ]

## ハマカンゾウ

*Hemerocallis fulva* (L.) L.  
var. *littorea* (Makino) M. Hotta

ユリ科  
Liliaceae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

選定理由 | 分布域が狭く，県内では「豊後水道域」の崖地に生育している。海岸の道路工事や人による踏みつけ，採取などにより，生育環境の悪化や減少が懸念される。

県内分布 | 豊後水道域

分布域 | 本州(関東地方南西部以西) 九州(大分・宮崎・鹿児島)

生育環境 | 海岸の崖地，草地や林縁。

現 状 | 釣り人の多い岩場では生育地が荒廃している。

備 考 | 国立・国定公園指定植物 [ 瀬戸内海，日豊海岸 ]

## ベニカンゾウ

*Hemerocallis fulva* (L.) L.  
var. *longituba* (Miq.) Maxim.

ユリ科  
Liliaceae

### カテゴリー

大分県 IB  
環境庁 掲載なし

選定理由 | 県内の生育地は点在し，人里に生育するため，圃場整備，道路工事などの土地改変により，絶滅の危険性が高い。

県内分布 | 耶馬溪・国東丘陵地，別府湾沿岸域，豊後水道後背地域，大野川上流域

分布域 | 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎)  
台湾 中国

生育環境 | 低地や丘陵地の畦や草地，岩角地。

現 状 | 田の畦や土手などの生育地では，圃場整備で消滅した所がある。

備 考 | 別名：ノカンゾウ