

ワニグチソウ

Polygonatum involucratum
(Franch. et Savat.) Maxim.

ユリ科
Liliaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

選定理由 県内では火山地域に集中的に分布し、個体数は少ない。森林伐採や植林などによる環境変化の影響を受け、生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布 九重火山群，大分川・大野川丘陵地

分布域 北海道 本州 四国 九州(大分・宮崎)
朝鮮半島 中国(東北部) ,ウスリー

生育環境 丘陵地や低山地の林内，林縁。

現 状 森林伐採や植林で衰退した生育地がある。

備 考 国立公園指定植物 [阿蘇くじゅう]

オニツルボ

Scilla scilloides (Lindl.) Druce
var. *major* Uyeki et Tokui

ユリ科
Liliaceae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由 全国的にも分布は限られ、本県では「豊後水道域」の海岸や島に生える。生育地は少なく、海岸開発や釣り人による環境変化が懸念される。

県内分布 豊後水道域

分布域 本州 四国 九州(佐賀・長崎・大分)

生育環境 海岸の岩場。

現 状 いずれの生育地も小さな群生地で個体数も少ない。

マルバサンキライ

Smilax vaginata Decne.
var. *stans* (Maxim.) T. Koyama

ユリ科
Liliaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

選定理由 県内では山地の谷部に生育し、生育地、個体数は僅少。森林の伐採や林道開発による生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布 大野川上流域，祖母・傾山地

分布域 本州 四国 九州(福岡・大分・宮崎)

生育環境 山地の溪谷沿い林内。

現 状 ごく最近、生育地が確認された。いずれも山地の溪谷沿いの林内に生育し、個体数は極めて少ない。