

シロバナエンレイソウ

Trillium tschonoskii Maxim.

ユリ科
Liliaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

選定理由 県内の生育地は極めて限られ、生育範囲は狭く、個体数も少ない。森林伐採や人による採取もあって、生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布 九重火山群，大分川・大野川丘陵地，祖母・傾山地

分布域 北海道 本州 四国 九州(熊本・大分・宮崎)
樺太 朝鮮半島

生育環境 低山地や山地の林内。

現 状 落葉広葉樹の林床に生育しているが、個体数は少ない。開花期は人目につきやすく、しばしば採取されている。

備 考 国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう，祖母傾]

キンバイザサ

Curculigo orchioides Gaertn.

ヒガンバナ科
Amaryllidaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

選定理由 県内の生育地は点在し、個体数は少ない。草原や林縁に生えるため、植生遷移の進行による生育環境の変化で、生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布 耶馬溪地区，豊後水道域

分布域 本州(中国地方以西) 四国九州(佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)，
沖縄
中国 台湾 インド マレーシア オーストラリア

生育環境 低地や丘陵地の草地や林縁。

現 状 日当たりのよい草丈の低い草地に生えるが、植生遷移の進行で生育環境が変わり、消滅した生育地がある。

ノハナショウブ

Iris ensata Thunb.
var. *spontanea* (Makino) Nakai

アヤメ科
Iridaceae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由 本県では北部・西部・中部地域に点在する。生育地、個体数ともに少なく、生育地の改変や人による採取が懸念される。

県内分布 日田低地・丘陵地，津江山地，玖珠丘陵地・山地，九重火山群，由布・鶴見火山群，大分川・大野川丘陵地

分布域 北海道 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
朝鮮半島 中国(東北部) アムール ウスリー

生育環境 丘陵地から山地の湿地。

現 状 野焼きの停止による植生遷移で、個体数が減少した所がある。また、観光地周辺では人による採取がみられる。

備 考 国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう，耶馬日田英彦山]