

キリシマシャクジョウ

Burmanna liukiensis Hayata

ヒナノシャクジョウ科
Burmanniaceae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁 IA

選定理由 県内では、アカガシ林に生育し、その落葉に腐生する。確認された生育地は極めて希。森林の伐採や攪乱により、絶滅の危険性が極めて高い。

県内分布 大野川上流域、(北川上流域)

分布域 本州(伊豆:神津島) 四国 九州(大分・宮崎・鹿児島) 沖縄

生育環境 丘陵地や低山地の常緑広葉樹林内。

現 状 「北川上流域」では個体数が極めて少なく、確認された後の生育状態は把握されていない。「大野川上流域」の生育地でも、年により生活状態の消長が著しい。

ヒナラン

Amitostigma gracile
(Bl.) Schltr.

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 IB

選定理由 全国的に分布域が狭い。県内での生育地は点在し、個体数は少ない。植生遷移の進行や人による採取で、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 耶馬溪・国東丘陵地、中津・宇佐低地、玖珠丘陵地・山地、豊後水道後背地域、大野川上流域

分布域 本州(近畿以西) 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) 朝鮮半島 中国・中国(東北部)

生育環境 低地や丘陵地の岩場。

現 状 岩場の環境変化や人による採取で、消滅した所がある。

備 考 国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう, 瀬戸内海, 祖母傾]

シラン

Bletilla striata
(Thunb.) Reichb. fil.

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 準

選定理由 日当たりのよい林縁や崖地に生育する。県内の生育地は散在していて、しばしば群生する。土地の改変による消滅や、人による採取が懸念される。

県内分布 耶馬溪地区、中津・宇佐低地、別府湾沿岸域、大分川・大野川丘陵地、豊後水道域、豊後水道後背地域、北川上流域

分布域 本州(中南部) 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) 中国

生育環境 低地や丘陵地のやや湿った崖地や林縁。

現 状 人目につきやすい生育地では消滅したり、個体数が大幅に減少している。

備 考 国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう, 瀬戸内海, 日豊海岸]