

ユウシュンラン

Cephalanthera erecta (Thunb.) Bl.
var. *subaphylla* (Miyabe et Kudo) Ohwi

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 II

選定理由 県内の生育地は局限され、生育環境に極めて敏感な小形植物。生育地周辺のわずかな変異でも消滅する要因を抱えている。個体数も極めて少なく、絶滅の危険性が高い。

県内分布 九重火山群，豊後水道後背地域，祖母・傾山地

分布域 北海道 本州 九州(長崎・大分・宮崎・鹿児島)

生育環境 低山地の林内。

現 状 生育地は陰地の狭い範囲に生育し、個体数も極めて少ない。環境変化に弱く、生育状態が持続しているか把握されない所が多い。

キンラン

Cephalanthera falcata
(Thunb.) Bl.

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 II

選定理由 県内の林縁や明るい林内に生育し、生育地は散在している。森林伐採や植生遷移の進行による生育環境の変化、人による採取で、生育地の減少が懸念される。

県内分布 耶馬溪・国東丘陵地，中津・宇佐低地，英彦山・犬ヶ岳山地，玖珠丘陵地・山地，九重火山群，由布・鶴見火山群，別府湾沿岸域，大分川・大野川丘陵地，豊後水道後背地域，大野川上流域，北川上流域

分布域 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
朝鮮半島 中国

生育環境 低地や丘陵地の林縁や林内。

現 状 里山の放置によって生育環境が変わって消滅したり、人による採取で個体数の減少が目立ってきている。

備 考 国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう，瀬戸内海，耶馬日田英彦山，日豊海岸]

ササバギンラン

Cephalanthera longibracteata Bl.

ラン科
Orchidaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

選定理由 県内生育地は点在し、ごく希に発見される。植生遷移による生育環境の変化で、生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布 九重火山群，由布・鶴見火山群，祖母・傾山地

分布域 北海道 本州 四国 九州(大分)
朝鮮半島 中国(東北部) 樺太 千島

生育環境 低山地や山地の林内。

現 状 生育地，個体数が極めて僅少。持続して生育しているかどうか把握されていない生育地がある。

備 考 本県は、分布の南限域にあたる。国立公園指定植物 [阿蘇くじゅう]。