

## ハシナガヤマサギソウ

*Platanthera mandarinorum*  
Reichb. fil.

ラン科  
Orchidaceae

### カテゴリー

大分県 II  
環境庁 掲載なし

選定理由 | 本県では火山山頂帯草原に希に生え、個体数は少ない。夏の登山期に開花するため人目につきやすく、人による採取で生育地の減少が懸念される。

県内分布 | 九重火山群

分布域 | 本州 四国 九州(佐賀・長崎・大分・鹿児島)  
中国

生育環境 | 火山山頂帯の草原や林縁。

現 状 | 山頂風衝地の草原に生え、個体数は少ない。花期は7～8月で、夏の登山シーズンと重なり、採取されることが多い。

## ヤマサギソウ

*Platanthera mandarinorum* Reichb. fil.  
var. *brachycentron* (Franch. et Savat.) Koidz.

ラン科  
Orchidaceae

### カテゴリー

大分県 II  
環境庁 掲載なし

選定理由 | 本県では火山性高原や尾根などの風衝地草原に生え、個体数は少ない。人による採取で生育地の減少が懸念される。

県内分布 | 玖珠丘陵地・山地，九重火山群，由布・鶴見火山群

分布域 | 北海道 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)  
朝鮮半島 中国 樺太

生育環境 | 丘陵地から山地の草原。

現 状 | 野焼きされる草原や尾根などの風衝地草原に生える。開花期は7～8月，夏山シーズンに開花するため，採取されることが多い。また，野焼きの停止による植生遷移の環境変化で，衰退した所がみられる。

備 考 | 国立公園指定植物 [ 阿蘇くじゅう，瀬戸内海 ]

## マイサギソウ

*Platanthera mandarinorum* Reichb. fil.  
var. *neglecta* (Schltr.) F. Maekawa

ラン科  
Orchidaceae

### カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 掲載なし

選定理由 |

県内分布 | (九重火山群)，(由布・鶴見火山群)，(北川上流域)

分布域 | 本州(秋田:手形山) 九州(大分・宮崎)

生育環境 | 丘陵地や山地の草原。

現 状 | 上記地域で採集された標本はあるが，いずれもその生育状態は把握されていない。