

## コケミズ

*Pilea peploides*  
(Gaudich.) Hook. et Arn.

イラクサ科  
Urticaceae

### カテゴリー

大分県 IB  
環境庁 掲載なし

**選定理由** 県内では海岸の湿った岩の隙間に生え、個体数は極めて少ない。波による被害や植生遷移の進行による環境変化で、絶滅の危険性が高い。

**県内分布** (英彦山・犬ヶ岳山地), 豊後水道域

**分布域** 本州(関東地方以西), 四国, 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) 沖縄  
朝鮮半島, 台湾, 中国, ウスリー, マレーシア, インド, ハワイ, ガラパゴス

**生育環境** 海岸の湿った岩の隙間。

**現 状** 「英彦山・犬ヶ岳山地」の標本はあるが、その生育地は把握されていない。「豊後水道域」は、ごく最近、生育地が確認された。

## ボロボロノキ

*Schoepfia jasminodora*  
Sieb. et Zucc.

ボロボロノキ科  
Olacaceae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

**選定理由** 県内では、西部と南部地域に偏在し、生育地、個体数とも少ない。低地の二次林にあるものは、里山の開発による森林伐採の影響が懸念される。

**県内分布** 日田低地・丘陵地, 豊後水道後背地域

**分布域** 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) 沖縄  
中国

**生育環境** 低地や丘陵地のやや乾燥した林内。

**現 状** カシ・シイ二次林に生え、個体数は少ない。

## ツクバネ

*Buckleya lanceolata* Miq.

ジャクダン科  
Santalaceae

### カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 掲載なし

**選定理由**

**県内分布** (玖珠丘陵地・山地), (豊後水道後背地域)

**分布域** 本州(近畿地方以東), 九州(大分)

**生育環境**

**現 状** 「玖珠丘陵地・山地」, 「豊後水道後背地域」の文献記録はあるが、その生育地は把握されていない。

**備 考** 文献 [原 寛: 日本顕花植物分布図 (1959)]