

ヤマブキソウ

Hylomecon japonica
(Thunb.) Prantl

ケシ科
Papaveraceae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 掲載なし

選定理由 県内の生育地は点在し、個体数は少ない。森林伐採や大雨による出水の影響を受けやすく、絶滅の危険性が高い。

県内分布 英彦山・犬ヶ岳山地、玖珠丘陵地・山地、九重火山群

分布域 本州 四国 九州(福岡・熊本・大分・宮崎)
中国

生育環境 低山地谷沿いの林内。

現 状 谷沿いの林内に点在し、いずれの生育地も個体数は少ない。

シコクハタザオ

Arabis serrata Franch. et Savat.
var. *sikokiana* (Nakai) Ohwi

アブラナ科
Cruciferae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 掲載なし

選定理由 分布域は狭い。県内の生育地は極めて希で、個体数も少ない。溪谷の崩壊やその防災工事などにより、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 九重火山群、由布・鶴見火山群

分布域 本州(東海道 近畿地方以西) 四国 九州(福岡・熊本・大分・宮崎)

生育環境 丘陵地から低山地の溪谷沿いの林縁。

現 状 生育地が溪谷沿いのため、崩壊したり流失したりして消滅した所がある。

備 考 九州は、分布の南限域にあたる。

ユリワサビ

Eutrema tenuis (Miq.) Makino

アブラナ科
Cruciferae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

選定理由 県内の生育地は点在し、個体数も少ない。林縁の生育地はしばしば人為により攪乱され、生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布 耶馬溪・国東丘陵地、英彦山・犬ヶ岳山地、津江山地、玖珠丘陵地・山地、九重火山群、大分川・大野川丘陵地、大野川上流域

分布域 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)

生育環境 低山地の林縁や林内。

現 状 各地の個体数は極めて少なく、かつての生育地で現在確認されない所がある。