

コイヌガラシ

Rorippa cantonoensis
(Lour.) Ohwiアブラナ科
Cruciferae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 準

選定理由 | 県内の分布域は限られており、生育地、個体数はともに僅少。道路計画に直面する生育地もあり、生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布 | 中津・宇佐低地

分布域 | 本州(関東地方以西) 四国 九州(福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎)
朝鮮半島 中国・中国(東北部) アムール 台湾

生育環境 | 低地のため池や水溝。

現 状 | 生育地は河川敷や水田周辺で、生育環境が不安定な所が多い。

モウセンゴケ

Drosera rotundifolia L.モウセンゴケ科
Droseraceae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由 | 湿地に生える。県内の生育地、個体数はともに少ない。湿地開発や水環境の変化により、生育地の減少が懸念される。

県内分布 | 耶馬溪・国東丘陵地、英彦山・犬ヶ岳山地、津江山地、九重火山群、由布・鶴見火山群、大分川・大野川丘陵地、大野川上流域、祖母・傾山地、北川上流域

分布域 | 北海道 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
北半球亜寒帯～温帯

生育環境 | 丘陵地から山地の日当たりのよい湿地。

現 状 | 湿地周辺では流れが変わったり、環境が乾燥したりして消滅した所がある。

備 考 | 国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう、瀬戸内海、耶馬日田英彦山、祖母傾]

チャボツメレンゲ

Meterostachys sikokianus
(Makino) Nakaiベンケイソウ科
Crassulaceae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 II

選定理由 | 県内での生育地はごく希で、個体数も少ない。環境の変化により、生育状態に消長がみられる。厳しい環境のため自然増殖は少なく、人による採取もあって、絶滅の危険性が高い。

県内分布 | 国東地区、祖母・傾山地

分布域 | 本州(西部) 四国 九州(福岡・長崎・大分・宮崎)
朝鮮半島(南部)

生育環境 | 丘陵地から山地の岩場。

現 状 | 日当たりのよい平らな岩場に生育しているが、個体数は限られ、植生遷移による環境の変化で減少傾向にある。