

## キレンゲショウマ

*Kirengeshoma palmata* Yatabe

ユキノシタ科  
Saxifragaceae

### カテゴリー

大分県 IB  
環境庁 II

**選定理由** 分布域は狭く、本県での生育地は点在し、個体数は極めて少ない。森林伐採や出水による流失、人による採取もあって生育地が減少し、絶滅の危険性が高い。

**県内分布** 祖母・傾山地

**分布域** 四国 九州(熊本・大分・宮崎)

**生育環境** 低山地や山地の渓谷沿いの林内や岩上。

**現 状** 大群生地もあったが、大雨で流失し、消滅した所がある。人による採取で、岩の割れ目などに根を張っているものが辛うじて残っている。

**備 考** 国定公園指定植物 [ 祖母傾 ]

## ツクシチャルメルソウ

*Mitella kiusiana* Makino

ユキノシタ科  
Saxifragaceae

### カテゴリー

大分県 II  
環境庁 II

**選定理由** 分布域が九州の一部だけで狭く、本県では東部や南部地域に分布し、いずれの生育地も個体数が少ない。大雨による流失や土砂の埋没、損傷などで、生育地の減少や消滅が懸念される。

**県内分布** 豊後水道域、豊後水道後背地域、大野川上流域、北川上流域

**分布域** 九州(熊本・大分・宮崎)

**生育環境** 渓谷沿いの湿った岩場。

**現 状** 大雨の出水によって流失した生育地がある。

**備 考** 国定公園指定植物 [ 祖母傾 ]

## コチャルメルソウ

*Mitella pauciflora* Rosend.

ユキノシタ科  
Saxifragaceae

### カテゴリー

大分県 II  
環境庁 掲載なし

**選定理由** 県内の分布は西部地域に限られ、生育地は少なく、生育範囲も狭い。渓谷沿いの林縁を生息地とするため、植生の遷移や出水による流失などで、生育地の減少や消滅が懸念される。

**県内分布** 英彦山・犬ヶ岳山地、日田低地・丘陵地、津江山地

**分布域** 本州 四国 九州(福岡・佐賀・熊本・大分)

**生育環境** 丘陵地や低山地の溪流辺林縁、林内。

**現 状** 台風時の出水で、消失した生育地が所々にみられる。