

## シラヒゲソウ

*Parnassia foliosa* Hook. fil. et Thoms.  
var. *nummularia* (Maxim.) T. Ito

ユキノシタ科  
Saxifragaceae

## カテゴリー

大分県 II  
環境庁 掲載なし

選定理由	西南日本に分布し、九州では欠ける地方もある。本県では中部や西部地域の火山地帯に偏在し、生育地は極めて少ない。湿地開発や人による採取で、生育地の減少や消滅が懸念される。
県内分布	玖珠丘陵地・山地，由布・鶴見火山群，九重火山群
分布域	本州(中～西部) 四国 九州(熊本・大分・宮崎)
生育環境	丘陵地や山地の湿地。
現 状	近年，観光開発による土地改変が著しく，生育地が減少している。
備 考	国立公園指定植物 [ 阿蘇くじゅう，瀬戸内海 ]

## ウメバチソウ

*Parnassia palustris* L.

ユキノシタ科  
Saxifragaceae

## カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

選定理由	日本全土に広く分布し、本県においてもほぼ全域に生育地が広がっている。草原の森林化や人工牧野への改変，人による採取などが懸念される。
県内分布	耶馬溪・国東丘陵地，英彦山・犬ヶ岳山地，津江山地，玖珠丘陵地・山地，九重火山群，由布・鶴見火山群，大分川・大野川丘陵地，豊後水道後背地域，大野川上流域
分布域	北海道 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) 北半球温帯～亜寒帯
生育環境	低地から低山地の草地。
現 状	生育地の草原は野焼きの停止などで森林化し，あるいは人工草地へ改変され，人による採取もあって，生育地の減少している所が多い。
備 考	国立・国定公園指定植物 [ 阿蘇くじゅう，瀬戸内海，耶馬日田英彦山，祖母傾 ]

## ワタナベソウ

*Peltoboykinia watanabei*  
(Yatabe) Hara

ユキノシタ科  
Saxifragaceae

## カテゴリー

大分県 II  
環境庁 II

選定理由	四国，九州に分布域が限られている。本県では「祖母・傾山地」のほか「由布・鶴見火山群」，「九重火山群」などの谷林内に生育する。森林伐採や入山者の踏みつけ，人による採取で生育地の減少が懸念される。
県内分布	九重火山群，由布・鶴見火山群，大分川・大野川丘陵地，祖母・傾山地，北川上流域
分布域	四国 九州(熊本・大分・宮崎)
生育環境	丘陵地や低山地の谷林内。
現 状	森林伐採や植生遷移で生育環境が変化して衰退した所や，人により採取された所がある。
備 考	ソハヤキ要素の植物。国立・国定公園指定植物 [ 阿蘇くじゅう，祖母傾 ]