

## ツチグリ

*Potentilla discolor* Bungeバラ科  
Rosaceae

## カテゴリー

大分県 IB  
環境庁 II

**選定理由** 全国的に分布域が狭い。本県でも北部地域に偏在し、個体数は極めて少ない。植生遷移の進行による環境変化や道路工事などにより、絶滅の危険性が高くなっている。

**県内分布** 耶馬溪・国東丘陵地，中津・宇佐低地，由布・鶴見火山群，別府湾沿岸域

**分布域** 本州(近畿地方) 九州(福岡・大分・鹿児島)  
朝鮮半島 台湾 中国・中国(東北部)

**生育環境** 丘陵地の草地や岩場。

**現 状** 道路がつくられて絶滅した所や，植生遷移が進行して生育状態の悪化した所がある。

## ツルキジムシロ

*Potentilla stolonifera* Lehm.バラ科  
Rosaceae

## カテゴリー

大分県 II  
環境庁 掲載なし

**選定理由** 本県の生育地，個体数はともに少ない。山頂帯付近の生育地は，植生の遷移や登山者の踏圧などにより，生育環境の悪化が懸念される。

**県内分布** 九重火山群，由布・鶴見火山群，祖母・傾山地

**分布域** 北海道 本州 九州(大分・宮崎・鹿児島)  
千島 樺太 ,カムチャッカ

**生育環境** 火山山頂帯や山地の草地，林縁。

**現 状** 山頂帯や登山路沿いの生育地は，植生遷移の進行や登山者による踏圧で生育状態が悪化している所がある。

**備 考** 北方寒冷地要素の植物。九州は，分布の南限域にあたる。

## ミヤマウラジロイチゴ

*Rubus idaeus* L.  
subsp. *nipponicus* Fockeバラ科  
Rosaceae

## カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 掲載なし

**選定理由**

**県内分布** (九重火山群)

**分布域** 本州(北～中部) 九州(大分)

**生育環境**

**現 状** 「九重火山群」で採集された標本はあるが，その生育地は把握されていない。