

**クモイオトギリ***Hypericum sikoku-montanum* Makino  
var. *hyugamontanum* (Y. Kimura) Ohwiオトギリソウ科  
Guttiferae**カテゴリー**大分県 情報不足  
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 (祖母・傾山地)

分布域 九州(大分)

生育環境

現 状 「祖母・傾山地」の標本，文献記録はあるが，その生育地は把握されていない。

備 考 基準標本産地 [ 祖母山 ]。文献 [ 木村陽二郎：日本産弟切草の記載植物学雑誌 52 (1938) ]

**ミズオトギリ***Triadenum japonicum*  
(Bl.) Makinoオトギリソウ科  
Guttiferae**カテゴリー**大分県 II  
環境庁 掲載なし

選定理由 県内の中部地域の湿地に点在し，個体数も少ない。湿地開発や乾燥化による生育環境の悪化で，生育地の減少が懸念される。

県内分布 (英彦山・犬ヶ岳山地)，津江山地，玖珠丘陵地・山地，九重火山群，由布・鶴見火山群

分布域 北海道 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)  
朝鮮半島 中国(東北部) ,アムール ,ウスリー

生育環境 丘陵地や低山地の湿地。

現 状 生育地が乾燥化して，生育状態が悪化した所がある。「英彦山・犬ヶ岳山地」の標本はあるが，その生育地は把握されていない。

**サクラスミレ***Viola hirtipes* S. Mooreスミレ科  
Violaceae**カテゴリー**大分県 II  
環境庁 掲載なし

選定理由 県内では西部・中部地域の火山性高原に偏在する。草原の野焼きの停止による植生遷移や植林，草地改良などにより，生育地の減少や消滅が懸念される。

県内分布 玖珠丘陵地・山地，九重火山群，由布・鶴見火山群

分布域 北海道 本州 四国 九州(熊本・大分・宮崎・鹿児島)  
朝鮮半島 中国(北部・東北部) ,ウスリー

生育環境 丘陵地から山地の草原や林縁。

現 状 人工草地の改変で消滅した所がある。