

ヒメアギスミレ*Viola verecunda* A. Gray
var. *subaequiloba* (Franch. et Savat.) F. Maekawaスミレ科
Violaceae**カテゴリー**大分県 II
環境庁 掲載なし**選定理由** 愛知県以西の西日本に分布する。本県での生育地は北部・西部地域に点在し、湿地の狭い範囲に生育している。土地開発により生育環境が改変され、生育地の消滅が懸念される。**県内分布** 中津・宇佐低地，日田低地・丘陵地，玖珠丘陵地・山地，九重火山群**分布域** 本州 四国 九州(福岡・佐賀・大分・鹿児島)**生育環境** 低地から山地の湿地。**現 状** 湿地開発により生育地が改変され，消滅した所がある。**ヒカゲスミレ***Viola yezoensis* Maxim.スミレ科
Violaceae**カテゴリー**大分県 II
環境庁 掲載なし**選定理由** 県内では北部・西部・南部地域に点在し，個体数も少ない。植生の遷移や森林伐採による生育環境の悪化で，生育地の減少や消滅が懸念される。**県内分布** 耶馬溪地区，英彦山・犬ヶ岳山地，九重火山群，大野川上流域，北川上流域**分布域** 北海道 本州 四国 九州(熊本・大分・宮崎)**生育環境** 丘陵地から山地の林内。**現 状** 植生遷移による生育環境の変化で消滅した所がある。**オニシバリ***Daphne pseudo-mezereum*
A. Grayジンチョウゲ科
Thymelaeaceae**カテゴリー**大分県 準
環境庁 掲載なし**選定理由** 県内の生育地は点在し，個体数も少ない。小低木のため植生遷移の進行により，生育環境が悪化し，生育状態の衰退や消滅が懸念される。**県内分布** 耶馬溪地区，中津・宇佐低地，由布・鶴見火山群，大分川・大野川丘陵地，豊後水道後背地域，石灰岩地域，大野川上流域**分布域** 本州 四国 九州(福岡・熊本・大分・宮崎)**生育環境** 丘陵地の林内。石灰岩地。**現 状** 植生遷移が進んで絶滅した生育地があり，個体数も減少傾向にある。