

ウメガサソウ

Chimaphila japonica Miq.

イチャクソウ科
Pyrolaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

- 選定理由** 県内での生育地は散在するが、個体数は少ない。主に林縁に生育するため、植生の遷移による環境悪化で、生育地の減少や消滅が懸念される。
- 県内分布** 耶馬溪・国東丘陵地、九重火山群、由布・鶴見火山群、別府湾沿岸域、石灰岩地域、大野川上流域、祖母・傾山地
- 分布域** 北海道 本州 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) 樺太 南千島 朝鮮半島 中国・中国(東北部) ウスリー
- 生育環境** 低地から低山地の林縁。
- 現 状** 生育環境が変化して消滅した生育地がある。また、人による採取もみられる。
- 備 考** 国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう, 瀬戸内海, 耶馬日田英彦山, 祖母傾]

マルバノイチャクソウ

Pyrola nephrophylla (H. Andr.) H. Andr.

イチャクソウ科
Pyrolaceae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

- 選定理由** 九州での分布域は狭い。本県では、山地の林内に希に生育し、個体数は僅少。森林伐採による環境変化や人による採取が懸念される。
- 県内分布** (英彦山・犬ヶ岳山地)、玖珠丘陵地・山地、祖母・傾山地、北川上流域
- 分布域** 北海道 本州 四国 九州(福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎) 南千島
- 生育環境** 山地の林内。
- 現 状** 森林伐採されて衰退した生育地がある。「英彦山・犬ヶ岳山地」の標本はあるが、その生育地は把握されていない。
- 備 考** 北方寒冷地要素の植物。九州は、分布の南限域にあたる。国立・国定公園指定植物 [瀬戸内海, 耶馬日田英彦山]

ツクシドウダン

Enkianthus campanulatus (Miq.) Nichols.
var. *longilobus* (Nakai) Makino

ツツジ科
Ericaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

- 選定理由** 分布域は九州に限られている。本県では山頂帯や尾根の岩場に生育するが、生育範囲は狭い。低木のため植生遷移の進行による環境変化や人による採取で、生育地の減少が懸念される
- 県内分布** 九重火山群、祖母・傾山地
- 分布域** 九州(熊本・大分・宮崎)
- 生育環境** 低山地や山地の林内。
- 現 状** 生育地は主として「九重火山群」や「祖母・傾山地」の山頂帯の岩場で、登山者による踏みつけや採取などの被害が生じた所がある。
- 備 考** 国立・国定公園指定植物 [阿蘇くじゅう, 耶馬日田英彦山, 祖母傾]