

タニジャコウソウ

Chelonopsis longipes Makino

シソ科
Labiatae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

選定理由 | 本県の生育地は点在し、個体数も少ない。低地や丘陵地の生育地は、河川工事や道路工事などで、生育地の減少や絶滅が懸念される。

県内分布 | 九重火山群、大分川・大野川丘陵地、豊後水道後背地域

分布域 | 本州(関東南部以西)、四国、九州(熊本・大分・宮崎・鹿児島)

生育環境 | 低地から低山地の湿った林縁。

現 状 | 河川工事や道路工事などで消滅した所や、林内の下刈りで衰退した所がある。

ジャコウソウ

Chelonopsis moschata Miq.

シソ科
Labiatae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 掲載なし

選定理由 |

県内分布 | (珍珠丘陵地・山地)、(九重火山群)

分布域 | 北海道、本州、四国、九州(長崎・熊本・大分・宮崎)

生育環境 | 低山地の林内。

現 状 | 「珍珠丘陵地・山地」、「九重火山群」で採集された標本はあるが、その後、生育状態は把握されていない。

ミズネコノオ

Eusteralis stellata (Lour.) Murata

シソ科
Labiatae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 II

選定理由 | 生育地が極めて希で、個体数も少ない。生育地の生育環境の変化が著しく、消滅した生育地があって、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 | (中津・宇佐低地)、(別府湾沿岸域)、豊後水道域

分布域 | 本州、四国、九州(福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
朝鮮半島、台湾、中国、東南アジア

生育環境 | 低地の水田、池畔や水湿地。

現 状 | 「中津・宇佐低地」、「別府湾沿岸域」から採集されているが、その後、生育状態は把握されていない。「豊後水道域」では、ごく最近、生育地が確認された。