

ミズトラノオ

Eusteralis yatabeana (Makino) Murata

選定理由

県内分布 (耶馬溪地区), (中津・宇佐低地)

シソ科
Labiatae

分布域 本州 四国 九州(福岡・佐賀・大分・宮崎・鹿児島)
朝鮮半島 中国(東北部) ,ウスリー

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 II

生育環境 低地のため池や水湿地。

現 状 上記の地域で採集されているが、その後、生育地の状況が変わり、いずれも生育状態は把握されていない。

マネキグサ

Lamium ambiguum (Makino) Ohwi

選定理由

県内分布 (耶馬溪地区), (英彦山・犬ヶ岳山地), (玖珠丘陵地・山地), (九重火山群)

シソ科
Labiatae

分布域 本州(神奈川県以西) 四国 九州(福岡・大分)

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 II

生育環境 丘陵地の溪谷沿いの林内。

現 状 上記地域の標本及び記録はあるが、いずれも生育状態は把握されていない。

ヒメキセワタ

Lamium chinense Benth.
var. *tuberiferum* (Makino) Murata

選定理由

県内分布 (豊後水道域)

シソ科
Labiatae

分布域 九州(大分・宮崎・鹿児島) 沖縄

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 IB

生育環境 海岸の畑地。

現 状 「豊後水道域」の島で採集された標本はあるが、その後、生育状態は把握されていない。