

シシンラン

Lysionotus pauciflorus Maxim.

イワタバコ科
Gesneriaceae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁 IB

選定理由 | 日本での分布域は狭い。本県での生育地は極めて希で、個体数も少ない。渓谷林の伐採により、絶滅の危険性が極めて高い。

県内分布 | 耶馬溪地区

分布域 | 本州(伊豆半島以西) 四国 九州(熊本・大分・宮崎・鹿児島)
中国(中南部)

生育環境 | 丘陵地の渓谷沿いの樹幹に着生。

現 状 | ごく少数の樹幹に着生しているので、森林伐採や人の採取で消滅する可能性が大きい。

備 考 | 国立公園指定植物 [阿蘇くじゅう]

イワギリソウ

Opithandra primuloides
(Miq.) B. L. Burtt

イワタバコ科
Gesneriaceae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁 IB

選定理由 | 分布域が狭く、県内での生育地は局限している。人による採取で著しく減少し、絶滅の危険性が極めて高い。

県内分布 | 国東地区

分布域 | 本州(近畿地方以西) 四国 九州(大分・鹿児島)

生育環境 | 丘陵地の岩上。

現 状 | 岩上に生育しているが、人の手が及ぶ所はほとんど採取されて、絶滅状態になっている所が多い。

備 考 | 九州は、分布の南限域にあたる。国立公園指定植物 [瀬戸内海]

ムラサキミミカキグサ

Utricularia affinis Wight

タヌキモ科
Lentibulariaceae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 II

選定理由 | 県内の生育地は点在し、個体数は少ない。湿地開発や植生遷移の進行による生育環境の悪化で、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 | 日田低地・丘陵地、津江山地、玖珠丘陵地・山地、九重火山群、由布・鶴見火山群

分布域 | 北海道 本州 四国 九州(福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
南アジア オーストラリア ニューカレドニア

生育環境 | 丘陵地の水湿地。

現 状 | 湿地の乾燥化が進行して生育状態が衰退し、生育状態の把握できない所がある。

備 考 | 国立公園指定植物 [阿蘇くじゅう、瀬戸内海]