

コマドリ

Erithacus akahige akahige
(Temminck)スズメ目
PASSERIFORMES
ツグミ科
Truidae

カテゴリー

大分県
環境庁 掲載なし

選定理由 | よく茂った森林が少なくなっており、県内の生息地は標高の高い場所に限定されるので、生息個体数も少ない。

県内分布 | 標高の高い山地に生息する夏鳥。

分布域 | 北海道 本州 四国 九州 屋久島に夏鳥。
日本だけで繁殖。中国南部で越冬。

生息環境 | 山地の下草にササのよく茂った落葉広葉樹林や針葉樹林に夏鳥として飛来し、湿った地上や窪みに営巣する。昆虫、ミミズ、クモ類などを食べる。

現 状 | 県内では標高1,200m程度より高いところにしか生息しない。個体数は少ない。

備 考 | 日本だけで繁殖する固有種である。

コルリ

Luscinia cyane bochaiensis
(Schulpin)スズメ目
PASSERIFORMES
ツグミ科
Truidae

カテゴリー

大分県
環境庁 掲載なし

選定理由 | 繁殖南限であり、生息地が限定されていて、生息個体数が少ない。

県内分布 | 標高の高い山地の落葉広葉樹林に生息する夏鳥。

分布域 | 北海道 本州中北部に夏鳥。
朝鮮半島 中国東北部 シベリア南部 サハリンで繁殖。中国南部、インドシナ半島で越冬。

生息環境 | 山地の針広混交林、落葉広葉樹林の茂った林床に住み、チョウ・ガ類やクモを捕食する。

現 状 | 県内では、黒岳と渡りの途中に平地でみられた観察記録のみ。

クロツグミ

Turdus cardis Temminckスズメ目
PASSERIFORMES
ツグミ科
Truidae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由 | 繁殖南限に近い。落葉広葉樹林が人工造林や森林伐採によって生息地が減少悪化している。

県内分布 | 低山に生息する夏鳥。

分布域 | 北海道 本州 四国 九州(熊本 大分)で夏鳥。
中国の一部と日本で繁殖。中国南部で越冬。

生息環境 | 山地や丘陵の針広混交林、広葉樹林に夏鳥として生息し、おもに林床でミミズや昆虫をとる。漿果も食べる。

現 状 | かつては、ふつうの夏鳥であったが、近年、生息数が減少し、声が聞こえる場所が少なくなってきた。

備 考 | 九州中央山地が繁殖南限。