シロウオ

Leucopsarion petersii Hilgendorf

選定理由 全国の河川の下流・河口域や内湾に分布する。県内では水質汚染,底

域の砂礫減少などにより,生息状態の悪化が懸念される。

県内分布 │ 別府湾および駅館川・寄藻川・臼杵川・番匠川の各水系

スズキ目 PERCIFORMES

ハゼ科 Gobiidae 分布域 北海道~九州

朝鮮半島

生息環境 | 伏流水の豊富な河川の下流~河口域及び内湾。

カテゴリー

大分県 準環境庁 準

現 状 | 漁獲量は以前に比べると年々減少している。

備 考 □ 県内では「シラウオ」として知られる。

ネムリミミズハゼ

Luciogobius dormitoris Shiogaki and Dotu

選定理由

県内分布

スズキ目 PERCIFORMES

ハゼ科 Gobiidae 分布 域

大分県

(佐志生川)

カテゴリー

大分県 情報不足環境庁 情報不足

生息環境

小河川の感潮域。

現 状 臼杵市佐志生川の感潮域で採集された完模式標本1個体のみが知られている。その後は採集されていない。

クボハゼ

Gymnogobius scobiculatus (Takagi)

選定理由

国内では西日本各地にわたり広く分布する種であるが,県内では2河川でその生息が確認されただけである。河口・沿岸域の護岸工事や干潟の埋め立てなどにより失われた生息地が多くなり,絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 スズキ目

駅館川および番匠川の河口域

PERCIFORMES

ハゼ科 Gobiidae

分布域

和歌山県 兵庫県 山口県 愛媛県 高知県 福岡県 大分県 宮崎県 対馬 , 五島列島

カテゴリー

大分県 IB 環境庁 IB

生息環境

河口域。

現 状 駅館川と番匠川の各河口域でその生息が確認されている。