

アオサナエ

Nihonogomphus viridis Oguma

トンボ目
ODONATA

サナエトンボ科
Gomphidae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由	河川中流域のゆるやかな流れに生息するため、河川改修や生活排水の流入による生息環境の悪化で、個体数の減少傾向がみられる。
県内分布	日田市、中津市、大山町、宇佐市、山香町、九重町、臼杵市、三重町、本匠村、弥生町、直川村
分布域	青森県を除く本州、四国、九州
生息環境	平地や丘陵地、低山地の河川中流域。
現状	川底の土砂を排出する改修工事により、著しく生息域が狭められている所がある。
備考	日本特産種。

オオルリボシヤンマ

Aeshna nigroflava Martin

トンボ目
ODONATA

ヤンマ科
Aeschnidae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由	生息は局地的であり、観光開発・土地造成などにより、環境の悪くなった生息地が生じてきた。
県内分布	天瀬町、玖珠町、九重町、庄内町、久住町
分布域	北海道、本州、九州、利尻島、佐渡島ほかの離島
生息環境	高地の湿原の滞水や挺水植物が繁茂する池沼。
現状	近年、観光開発により、生息域が狭められている所がある。
備考	日本特産種。

ネアカヨシヤンマ

Aeschnophlebia anisoptera Selys

トンボ目
ODONATA

ヤンマ科
Aeschnidae

カテゴリー

大分県
環境庁 掲載なし

選定理由	生息地周辺の宅地化による生活排水の流入や、池沼の改修工事などによる生息環境の悪化で、個体数の減少が懸念される。
県内分布	中津市、宇佐市
分布域	茨城、千葉、埼玉、新潟より西の本州、四国、九州、伊豆大島、淡路島ほかの離島
生息環境	周囲に森林がある平地のヨシやガマなどが繁茂した池沼。
現状	水田転作による用水池の放置や改修工事などで、生息個体数の極端な減少がみられる。