

シロヘリツチカメムシ

Canthophorus nivemarginatus
(Scott)

カメムシ目
HEMIPTERA
ツチカメムシ科
Cydnidae

カテゴリー

大分県
環境庁 準

選定理由 火山性草原地帯のリゾート化，牧野改良，農耕地化，宅地化などによる生息環境の悪化が懸念される。

県内分布 別府市，湯布院町，天瀬町，玖珠町，九重町，庄内町，直入町，久住町，竹田市，荻町

分布域 本州 四国 九州
中国中東北部，シベリア，朝鮮半島，フィンランド

生息環境 標高500m以上の火山性草原地帯。

現 状 野焼きの停止や，リゾート化により，生息環境である草原が消滅している。

ベニツチカメムシ

Parastrachia japonensis (Scott)

カメムシ目
HEMIPTERA
ツチカメムシ科
Cydnidae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由 生息は照葉樹の自然林に限られ，個体数も少ない。森林伐採などによる生息環境の変化が懸念される。

県内分布 日田市，玖珠町，庄内町，九重町，野津原町，大野町，三重町，緒方町，清川村，竹田市，宇目町

分布域 本州 九州
濟州島

生息環境 林内のシイ・ヒサカキなどの葉上に群生。

現 状 平野部や低山地でほとんど生息が確認できず，標高の高い深山でも確認される個体数が少なくなっている。

備 考 すう光性が強く，人が近づくと音(鳴声)を発する習性がある。

アカアシクチブトカメムシ

Pinthaeus sanguinipes (Fabricius)

カメムシ目
HEMIPTERA
カメムシ科
Pentatomidae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由 牧野改良や農地造成，シイタケの原木伐採などで個体数が減少し，生息環境の変化が懸念される。

県内分布 耶馬溪町，山国町，玖珠町，湯布院町，別府市，九重町，久住町

分布域 本州 四国 九州
朝鮮半島，中国，シベリア，欧州

生息環境 くじゅう火山性草原と疎林周辺及び英彦山山頂部の自然林。

現 状 生息地でも個体数は減少している。