

オオクワガタ

Dorcus hopei (E.Saunders)

コウチュウ目
COLEOPTERA
クワガタムシ科
Lucanidae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 準

選定理由 主に平地の里山を生息地としており、樹木の伐採による大木の減少により個体数が減少し、絶滅の危険性が高い。

県内分布 宇佐市

分布域 北海道 本州 四国 九州 対馬
朝鮮半島 中国

生息環境 幼虫は平地の腐朽した広葉樹の朽ち木に入り、成虫になると広葉樹の樹液のある場所に生息。

現 状 宇佐市の生息地でも、個体数は非常に少ない。

ムネアカセンチコガネ

Bolbocerosoma nigroplagiatum
(Waterhouse)

コウチュウ目
COLEOPTERA
センチコガネ科
Geotrupidae

カテゴリー

大分県
環境庁 掲載なし

選定理由 里山の都市化と牧草地や草原の荒廃により、生息地の減少が懸念される。

県内分布 九重町、湯布院町、別府市、大分市、久住町、犬飼町

分布域 北海道 本州(伊豆諸島を含む) 四国 九州(壱岐を含む)
朝鮮半島

生息環境 山地の放牧場が隣接する草原地帯。

現 状 草原の管理が生息環境に影響を及ぼしており、生息地での個体数は減少している。

アカマダラセンチコガネ

Ochodaeus maculatus maculatus
Waterhouse

コウチュウ目
COLEOPTERA
コガネムシ科
Scarabaeidae

カテゴリー

大分県
環境庁 掲載なし

選定理由 全国的に希な種であり、県内でも個体数は非常に少なく、森林伐採や草地改良など環境の変化による生息地の消滅や減少が懸念される。

県内分布 九重町、湯布院町、庄内町、宇目町

分布域 本州 四国 九州 対馬 屋久島

生息環境 山地の草地が隣接する森の、木漏れ日が差し込むような場所。

現 状 生息地での個体数は減少している。

備 考 獣糞または植物のいずれを食すのか、食性は不明。黄昏時の飛翔活動など特異な生態をもつ。