

ゴホンダイコクコガネ

Copris acutidens Motschulsky

コウチュウ目
COLEOPTERA
コガネムシ科
Scarabaeidae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由 放牧場などの減少により個体数は減少している。生息環境の悪化が懸念される。

県内分布 玖珠町, 九重町, 湯布院町, 別府市, 庄内町, 久住町, 緒方町, 直川村

分布域 北海道 本州 四国 九州 佐渡 五島
朝鮮半島 中国

生息環境 山地, 低山地の獣糞(牛・犬)のある場所。

現 状 放棄される牧草地が増え, 糞虫である本種の生息域はかなり減少している。

ダイコクコガネ

Copris ochus Motschulsky

コウチュウ目
COLEOPTERA
コガネムシ科
Scarabaeidae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 準

選定理由 主に牧場の牛馬糞に依存している種であるため, 放牧場の減少による生息地の減少傾向が懸念される。

県内分布 玖珠町, 九重町, 湯布院町, 久住町, 竹田市

分布域 北海道 本州 四国 九州 佐渡 伊豆諸島 沓岐 口永良部島 屋久島
濟州島 朝鮮半島 シベリア東部 中国 モンゴル

生息環境 山地の放牧場の牛糞のある場所。

現 状 放棄される牧草地が増え, 個体数が減少した生息地が多い。

ヒゲコガネ

Polyphylla laticollis Lewis

コウチュウ目
COLEOPTERA
コガネムシ科
Scarabaeidae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由 河川敷などに多数生息していたが, 河川改修工事などによる生息環境の変化が懸念される。

県内分布 中津市, 山香町, 大分市, 野津原町, 臼杵市, 三重町

分布域 本州 四国 九州
朝鮮半島 中国

生息環境 おもに河原の草地。

現 状 河川改修や宅地化により, 個体数が減少している生息地が多い。