

## イッシキキモンカミキリ

*Glenea centroguttata* Fairmaire

コウチュウ目  
COLEOPTERA  
カミキリムシ科  
Cerambycidae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

選定理由 里山が主な生息地のため、人為的影響を受けやすく、生息環境の変化が懸念される。

県内分布 庄内町，直入町，野津町，犬飼町，緒方町，宇目町

分布域 本州 四国 九州(熊本・大分・宮崎)  
台湾 中国西部

生息環境 幼虫はヌルデを食草とし、成虫は里山のクワにみられる。

現 状 生息地では、各地とも個体数は少ない。

## ホソリンゴカミキリ

*Oberea nigriventris* Bates

コウチュウ目  
COLEOPTERA  
カミキリムシ科  
Cerambycidae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

選定理由 県内では局地的に分布し、生息地は伐採などの人為的影響を受けやすく、生息環境の変化が懸念される。

県内分布 湯布院町，庄内町，鶴見町，米水津村

分布域 本州 四国 九州(福岡・大分・宮崎・鹿児島) 対馬 屋久島  
台湾 中国 インドシナ 南アジア

生息環境 海岸線から山地に分布し、海岸部では林縁のサカキカヅラやイケマ、山地ではツクシガシワが食草。

現 状 食草の生育状態の変化で生息状態が変わりやすく、個体数の減少した所がある。

## ブロイニングカミキリ

*Saperda ohbayashii* Podany

コウチュウ目  
COLEOPTERA  
カミキリムシ科  
Cerambycidae

### カテゴリー

大分県 IB  
環境庁 掲載なし

選定理由 九州では大分県にのみ分布し、極めて希な種。生息地は溪谷部の狭い範囲であり、生息環境の悪化で絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 九重町，緒方町

分布域 北海道 本州 九州(大分)

生息環境 溪谷部の落葉広葉樹林のケヤキの細枝。

現 状 県内では九重町と緒方町で生息が確認されている。