

ミヤケカレハ

Takanea miyakei (Wileman)

チョウ目
LEPIDOPTERA

カレハガ科
Lasiocampidae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 (緒方町)

分布域 本州(関東～中部地方) 四国 九州
中国(雲南省) 台湾

生息環境 高地の森林。

現 状 1950年代に傾山で採集されているが、その後、生息が確認されていない。

備 考 九州の高地、四国高地及び本州の紀伊半島高地に生息するものは本州の個体群と異なる特徴を有するので別亜種*excisa*として扱われることがある。

ヒサゴスズメ

Mimas christophi (Staudinger)

チョウ目
LEPIDOPTERA

スズメガ科
Sphingidae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 (九重町)

分布域 北海道 本州 四国 九州(熊本・大分)
朝鮮半島 ,サハリン ,シベリア南部

生息環境 ハンノキを食草とする。

現 状 九重山地から古く記録されたスズメガで、その後半世紀にわたって生息が確認されていない。

備 考 九州では高地で2例の記録がある。

ヒメスズメ

Deilephila askoldensis
(Oberthur)

チョウ目
LEPIDOPTERA

スズメガ科
Sphingidae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

選定理由 全国的に特異な分布をするが、県内では広く分布し、生息地での個体数は少なくない。生息環境が草原のため、その生息環境の変化が懸念される。

県内分布 久住町, 庄内町, 朝地町, 宇目町, 竹田市

分布域 北海道 本州 四国 九州(熊本・大分)
朝鮮半島 ,シベリア南部

生息環境 九重山系の一次草原。キバナカワラマツバが食草。

現 状 久住町では個体数は少なくない。