

ヤミサラグモ類

Arcuphantes spp.

新蛛亜目
METATHELAE
サラグモ科
Linyphiidae

カテゴリー

大分県 地域個体群
環境庁 掲載なし

選定理由 山国町天の岩戸溪流，大分市九六位山経塚，臼杵市東沖野，米水津村沖黒島などの林内陰地の林床，草むらなどに生息。各生息地ごとに種が異なる傾向がある。

県内分布 山国町天の岩戸溪流，大分市九六位山経塚，臼杵市東沖野川原内の穴，米水津村沖黒島

分布域 九州(大分)

生息環境 森林林内の草本，林床，低木などに造網。

現 状 各地とも，小規模個体群は維持中であるが，個体数は1990年代に入って減少中。

マルサラグモ類

Centromerus spp.

新蛛亜目
METATHELAE
サラグモ科
Linyphiidae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 掲載なし

選定理由 野津町風蓮洞に生息。洞内人工照明により生息環境が狭小化し，個体数が減少している。

県内分布 耶馬溪町錦雲峡，三重町松尾谷高屋

分布域 九州(大分)

生息環境 アラカシ林林縁などのコウヤボウキの末端の小枝などに造網。

現 状 耶馬溪町錦雲峡，三重町松尾谷などに生息するマルサラグモ属の各種，個体数が極めて少ないため，情報不足とした。

ヨツボシサラグモ類

Strandera spp.

新蛛亜目
METATHELAE
サラグモ科
Linyphiidae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 九重町，久住町，宇目町

分布域 本州 九州

生息環境 森林林縁部などの低木やブッシュの植生空間に生息するが，落葉層空間などにも生息する。

現 状 標高400～1,000m付近のノリウツギ，ネジキなどの低木で極めて希に遭遇する種で，小規模範囲に小個体群を形成する。