

## ナンキングモ類

*Erigonidium* spp.

新蛛亜目  
METATHELAE  
サラグモ科  
Linyphiidae

### カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 ほぼ県内全域

分布域 本州 九州

生息環境 農耕地などの裸地化された地表面の小さな窪地地形にシート網を造網。

現 状 農耕地などに多いが、耕作放棄、休耕田の増加などで急減している。

## チビサラグモの1種

*Nematogmus* sp.

新蛛亜目  
METATHELAE  
サラグモ科  
Linyphiidae

### カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 大分市東部，佐賀関町

分布域 本州 四国 九州

生息環境 山地の草地。草本層の特に根元や株もとなどにシート網を張る。

現 状 コジイ林林縁部などのコモチシダ群落に生息するも、県下では佐賀関町～大分市坂ノ市などに希に確認される。

## (和名未定)

*Ero koreana* Paik

新蛛亜目  
METATHELAE  
センショウグモ科  
Mimetidae

### カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 大分市三佐松原緑地クロマツ林

分布域 不明

生息環境 海岸低木林の枝先に造網。

現 状 大分市松原緑地にのみ生息。吉田哉による同定であるが、1999年現在、継続論議中の種で確認は一例のみである。