

## ヤチグモ類

*Coelotes* spp.

新蛛亜目  
METATHELAE  
タナグモ科  
Agelenidae

### カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 ほぼ県内全域

分布域 本州中部以南 四国 九州

生息環境 主として農村地帯～自然林。森林のリター，袖群落の根方，林内崖地の窪みなどに棚網を作って生息。

現 状 各地域の自然林のリターや洞穴などで，複数のヤチグモ類が確認されているが，西川による多様性判断に従い，大分県内の *Coelotes* 属は未だ種未確認のものが多い。

## フノジグモ

*Synaema globosum japonicum*  
Karsch

新蛛亜目  
METATHELAE  
カニグモ科  
Thomisidae

### カテゴリー

大分県 準  
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 ほぼ県内全域

分布域 本州中部以南 四国 九州

生息環境 林内，林縁を問わず，草地なども利用している。

現 状 ほぼ全県域に生息していたが，1985年ごろから減少中で，1995年ごろからは個体数において「希少」と判断される。個体数減少が著しく，特に都市部周辺では目撃例が急減した。

## クロボシカニグモの1種

*Xysticus* sp.

新蛛亜目  
METATHELAE  
カニグモ科  
Thomisidae

### カテゴリー

大分県 情報不足  
環境庁 掲載なし

選定理由

県内分布 ほぼ県内全域

分布域 本州中部 九州

生息環境 山地低木類の葉上などを徘徊。

現 状 1982年頃から，林内低木などでの発見が困難になり，1997年ごろから個体数が急激に減少中である。米水津村沖の黒島では，オニヤブソテツ，ヤマアイなどの草本層で安定した個体群が維持されている。