

ヒロクチカノコガイ

Neritina (Dostia) violacea
(Gmelin)

アマオブネガイ科
Neritidae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 希少種(1991)
水産庁 希少種

選定理由 国内・県内ともに生息地は少ない。河口の汽水域に生息するが、開発や水質汚染などのために生息条件が著しく悪化している。

県内分布 中津市, 宇佐市, 豊後高田市, 真玉町

分布域 本州(東京湾以西) 四国 九州(福岡・長崎・熊本・大分) 沖縄
中国南部, インド, 太平洋域

生息環境 汽水域の止水中や小石混じりの砂泥上, 捨て石, コンクリート護岸。

現 状 希に群生していることもあるが、通常は個体数が少なく消滅寸前といえる生息地もある。

備 考 WWFの指定ランク：絶滅寸前

ヒナユキスズメガイ

Phenacolepas sp.

ユキスズメガイ科
Phenacolepadidae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁 掲載なし

選定理由 全国的に分布地は極めて少なく、生息地は狭い区域に局限される。開発や水質汚染などで個体数が危機的状態にまで減少している。

県内分布 真玉町, 日出町

分布域 本州(愛知・山口) 九州(大分)

生息環境 汽水域のヨシ原近くの泥地で、半ば埋もれた石の裏面。

現 状 特殊な環境に適応して生息しているので、埋め立てや河川の改修などのために、生息地が少なくなっている。

備 考 本種は未記載種。WWFの指定ランク：危険

ミヤコドリガイ

Cinnalepeta pulchella
(Lischke)

ユキスズメガイ科
Phenacolepadidae

カテゴリー

大分県 IA
環境庁 掲載なし

選定理由 全国的に生息地は局限される。本県でも生息地は極めて希で個体数は少ない。開発や水質汚染などで、危機的水準にまで個体数が減少している。

県内分布 日出町

分布域 本州(房総・男鹿半島以西) 四国 九州(大分)

生息環境 汽水域のヨシ原近くの泥地で、半ば埋もれた石の裏面。

現 状 特殊な環境に適応して生息しているので、埋め立てや河川の改修などのために、生息適地が少なくなっている。

備 考 WWFの指定ランク：危険