

クリイロコミミガイ

Laemodonta siamensis
(Morelet)

オカミミガイ科
Ellobiidae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 掲載なし

選定理由 国内・県内ともに分布地が少なく局限される。開発や水質汚染のために生息条件が悪化し、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 中津市，宇佐市，真玉町，杵築市，日出町，別府市

分布域 本州(三河湾以西) 四国 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・鹿児島) 沖縄

生息環境 汽水域のヨシ原で、泥に埋もれた石や漂着物の下。

現 状 干潟の減少によって生息適地が少なくなり、現在では僅かな河川に生息しているにすぎない。

備 考 WWFの指定ランク：危険

ウスコミミガイ

Laemodonta exaratooides
Kuroda(MS)

オカミミガイ科
Ellobiidae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 掲載なし

選定理由 三河湾や山口に分布域をもつが分布地は少なく、本県の生息地は局限される。開発や水質汚染のために環境が悪化して、絶滅の危険性が高くなっている。

県内分布 日出町

分布域 本州(三河湾・山口) 四国 九州(佐賀・熊本・大分) 沖縄
朝鮮半島

生息環境 汽水域の高潮帯で、転石の間や泥に埋もれた石の下。

現 状 干潟の減少によって生息適地が少なくなり、現在では僅かな河川に生息しているにすぎない。

備 考 WWFの指定ランク：危険

ハマダモノアラガイ

Radix hamadai Habe

モノアラガイ科
Lymnaeidae

カテゴリー

大分県 情報不足
環境庁 I

選定理由

県内分布 (竹田市)

分布域 九州(大分)

生息環境 山間の小さな溪流で、藻のついた岩や用水路の壁面・アカバナの根元。

現 状 1977年以降生息の確認ができていない。

備 考 模式標本産地 [竹田市神原]